

FONCTION DE SOINS	COEFFICIENT 1	COEFFICIENT 4	COEFFICIENT 10	COEFFICIENT 20
<p><u>SOINS DE BASE</u></p> <p>Groupe de soins :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentation 	<p><u>AUTONOMIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Repas : recueil du choix du menu, installation et distribution 	<p><u>DEPENDANCE MODEREE</u></p> <p>Dans au moins 2 groupes de soins</p> <p>Aide ponctuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boissons ≤ 6 / 24 h - Restriction hydrique 	<p><u>DEPENDANCE MAJEURE</u></p> <p>Dans au moins 2 groupes de soins</p> <p>Aide permanente ou réalisation de la quasi totalité des soins</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boissons > 6 / 24 h 	<p><u>DEPENDANCE TOTALE</u></p> <p>Dans au moins 2 groupes de soins</p> <p>Suppléance totale</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Locomotion mobilisation 		<ul style="list-style-type: none"> - Installation - Aide pour le lever, la marche, la mise au fauteuil, la douche, la toilette, le déshabillage, l'habillage (1aide) 	<ul style="list-style-type: none"> - Aide pour le lever, la marche, la mise au fauteuil (2 aides) 	<ul style="list-style-type: none"> - Alitement permanent - Changements de position fréquents
<ul style="list-style-type: none"> - Elimination 		<ul style="list-style-type: none"> - Installation sur le bassin (ou mise à disposition de l'urinal) - Change de stomie - Penilex : pose et surveillance. Vidange de poche 		
<ul style="list-style-type: none"> - Hygiène et confort 	<ul style="list-style-type: none"> - Réfection du lit 	<ul style="list-style-type: none"> - Change < 4 fois par 24h pour incontinence - Petits soins d'hygiène <ul style="list-style-type: none"> - Soins de bouche - Soins d'yeux - Bas anti thrombose : pose et Surveillance 	<ul style="list-style-type: none"> - Toilette au lit - Change 4 à 6 fois par 24h pour incontinence - Prévention d'escarres 	<ul style="list-style-type: none"> - Change > 6 fois par 24 h pour incontinence - Prévention d'escarre > 6 fois par 24 h - Toilette complète au lit - Toilette mortuaire

<u>SOINS</u>	<u>SOINS LEGERS</u>	<u>SOINS COURTS</u>	<u>SOINS LOURDS</u>	<u>SOINS TRES LOURDS</u>
<p><u>TECHNIQUES</u> (Prédominance de soins)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prélèvements (sang et/ou urine) ou injections ≤ 4 / 24 h dont ECBU/hémocultures - Surveillance des constantes ≤ 4 / 24 h (pouls, TA, température, saturation en O2, fréquence respiratoire) - Surveillance poids et taille - Surveillance de la douleur (EVA) - Diurèse - Bandelette urinaire - Glycémie capillaire - Quantifier les entrées et comptabiliser les sorties (Bilan entrée sortie) - Médicaments per os : distribution et aide à la prise - Soins de bouche avec médicaments - Instillation oculaire - E.C.G 	<ul style="list-style-type: none"> - Prélèvements ou injections : 4 a 6 / 24 h - Surveillance des constantes 4 a 8 / 24 h - Perfusion simple (pose, surveillance, retrait) - Cathétérisme veineux - Surveillance vomissements - Pose et surveillance de sonde nasogastrique - Pose et surveillance de sonde vésicale - Aérosol - Soins pré - opératoires - Aide pour ponction - biopsie - Pansement simple : <ul style="list-style-type: none"> - Cicatrice - Perfusion 	<ul style="list-style-type: none"> - Médicaments per os : distribution et aide à la prise > 6 / 24 h - Aide à ponction complexe - Port à Cath (PAC) : <ul style="list-style-type: none"> - Préparation - Surveillance - Pose et retrait aiguille - KT central <ul style="list-style-type: none"> - Prélèvements et/ou injection - Gaz du sang - Pansement complexe - Alimentation entérale - Surveillance post ponction lombaire/ biopsie ostéomédullaire / biopsie hépatique. - Surveillance PCA (Patient Controlled Analgesia) <p><u>Soins légers et courts répétés</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Surveillance constantes > 8 / 24 h - Injections répétées > 6 / 24 h 	<ul style="list-style-type: none"> - Perfusion lourde (> 2 seringues électriques / PCA) + diurèse + surveillance constantes / heure - Pansements lourds et / ou répétés > 3 / 24 h <ul style="list-style-type: none"> - PAC - KT central - Port à Cath (PAC)/ PICC line : Prélèvements et/ou injection - Protocole extravasation PAC (vider, aspirer et pansement) - Transfusion - Aspirations itératives - Assistance continue - Surveillance risque de choc anaphylactique

<u>SOINS</u>	<u>AUTONOMIE</u>	<u>DEPENDANCE MODEREE</u>	<u>DEPENDANCE MAJEURE</u>	<u>DEPENDANCE TOTALE</u>
<u>RELATIONNELS</u> <u>ET EDUCATIFS</u> (Personne soignée et / ou la famille)	<ul style="list-style-type: none"> - Information succincte et ponctuelle - Instruction sur un problème de santé, un régime - Observation des comportements 	<ul style="list-style-type: none"> - Reformulation et explications - Informations d'aide contre : <ul style="list-style-type: none"> - l'anxiété - la solitude - la vie hospitalière - Relation d'aide a la vie quotidienne 	<ul style="list-style-type: none"> - Aide dans les situations et relations difficiles : dépression, angoisse majeure - Stimulations fréquentes pour reprise de conscience - Apprentissage de nouveaux comportements, d'auto - soins a la personne soignée ou a la famille. - Education thérapeutique - Soins de support (équipe support) 	<ul style="list-style-type: none"> - Accompagnement en situation de crise du patient : <ul style="list-style-type: none"> - désorientation, - agitation extrême, - décès - Soins de support avec infirmière d'Annonce (IDA)