

FONCTION DE SOINS	COEFFICIENT 1	COEFFICIENT 4	COEFFICIENT 10	COEFFICIENT 20
<p><u>SOINS DE BASE</u></p> <p>Groupe de soins :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentation 	<p><u>AUTONOMIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Repas : recueil du choix du menu, installation et distribution 	<p><u>DEPENDANCE MODEREE</u></p> <p>Dans au moins 2 groupes de soins</p> <p>Aide ponctuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boissons ≤ 6 / 24 h - Restriction hydrique - Aide aux repas suite œsophagectomie 	<p><u>DEPENDANCE MAJEURE</u></p> <p>Dans au moins 2 groupes de soins</p> <p>Aide permanente ou réalisation de la quasi totalité des soins</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boissons > 6 / 24 h 	<p><u>DEPENDANCE TOTALE</u></p> <p>Dans au moins 2 groupes de soins</p> <p>Suppléance totale</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Locomotion mobilisation 		<ul style="list-style-type: none"> - Installation - Aide pour le lever, la marche, la mise au fauteuil, la douche, la toilette, le déshabillage, l'habillage (1aide) 	<ul style="list-style-type: none"> - Aide pour le lever, la marche, la mise au fauteuil (2 aides) 	<ul style="list-style-type: none"> - Alitement permanent - Changements de position fréquents
<ul style="list-style-type: none"> - Elimination 		<ul style="list-style-type: none"> - Installation sur le bassin (ou mise à disposition de l'urinal) - Change de stomie - Penilex : pose et surveillance. Vidange de poche 		
<ul style="list-style-type: none"> - Hygiène et confort 	<ul style="list-style-type: none"> - Réfection du lit 	<ul style="list-style-type: none"> - Change < 4 fois par 24h pour incontinence - Petits soins d'hygiène <ul style="list-style-type: none"> - Soins de bouche - Soins d'yeux - Bas anti thrombose : pose et Surveillance 	<ul style="list-style-type: none"> - Change 4 à 6 fois par 24h pour incontinence - Toilette au lit - Prévention d'escarres 	<ul style="list-style-type: none"> - Change > 6 fois par 24 h pour incontinence - Prévention d'escarre > 6 fois par 24 h - Toilette complète au lit - Toilette mortuaire -

SOINS	SOINS LEGERS	SOINS COURTS	SOINS LOURDS	SOINS TRES LOURDS
<p>TECHNIQUES (Prédominance de soins)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prélèvements (sang et/ou urine) ou injections ≤ 4 / 24 h dont ECBU/ hémocultures - Surveillance des constantes ≤ 4 / 24 h (pouls, TA, température, saturation en O2, fréquence respiratoire) - Surveillance poids et taille - Surveillance de la douleur (EVA) - Diurèse - Bandelette urinaire - Glycémie capillaire - Quantifier les entrées et comptabiliser les sorties (Bilan entrée sortie) - Médicaments per os : distribution et aide a la prise - E.C.G 	<ul style="list-style-type: none"> - Prélèvements ou injections : 4 a 6 / 24 h - Surveillance des constantes 4 a 8 / 24 h - Perfusion simple (pose, surveillance, retrait) - Cathétérisme veineux - Pose et surveillance de sonde naso gastrique - Pose et surveillance de sonde vésicale - Surveillance drain - Aérosol - Soins pré opératoires (tonte chirurgicale) - Aide pour ponction - biopsie - Pansement simple : <ul style="list-style-type: none"> - Escarre locale - Cicatrise - Perfusion 	<ul style="list-style-type: none"> - Médicaments per os : distribution et aide a la prise toutes les 2 h - Port à Cath (PAC) : <ul style="list-style-type: none"> - Pose et retrait aiguille - Surveillance - Alimentation entérale - Transfusion de plaquettes, albumine - Education auto-sondage dans le cadre des endométrioses (sondage vésicale) - Pansement complexe <ul style="list-style-type: none"> - Avec appareillage : Stomie - Transformation de J.PRAT - Avec méchages divers - Vac-thérapie <p><u>Soins légers et courts répétés</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Surveillance constantes > 8 / 24 h - Injections répétées > 6 / 24 h 	<ul style="list-style-type: none"> - Médicaments per os : distribution et aide a la prise toutes les heures - Perfusion lourde (> 2 seringues électriques / PCA) + diurèse + surveillance constantes I heure - Port à Cath (PAC) : <ul style="list-style-type: none"> - Prélèvements et/ou injection - Retrait cathéter central - Transfusion sang - Aspirations itératives - Assistance continue - Pansements lourds et / ou répétés > 3 / 24 h <ul style="list-style-type: none"> - Vac-thérapie > 2 / 24 h - Mickulitz

<u>SOINS</u>	<u>AUTONOMIE</u>	<u>DEPENDANCE MODEREE</u>	<u>DEPENDANCE MAJEURE</u>	<u>DEPENDANCE TOTALE</u>
<p><u>RELATIONNELS</u> <u>ET EDUCATIFS</u> (Personne soignée et /ou la famille)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Information succincte et ponctuelle (accueil du patient, avant et au retour d'examens) - Instruction sur un problème de santé, un régime - Observation des comportements 	<ul style="list-style-type: none"> - Reformulation et explications (accueil du patient, avant et au retour du bloc opératoire) - Informations d'aide contre : <ul style="list-style-type: none"> - l'anxiété - la solitude - la vie hospitalière - Relation d'aide a la vie quotidienne 	<ul style="list-style-type: none"> - Aide dans les situations et relations difficiles : dépression, angoisse majeure - Stimulations fréquentes pour reprise de conscience - Apprentissage de nouveaux comportements, d'auto - soins a la personne soignée ou a la famille : <ul style="list-style-type: none"> - Education du diabète - Education dans le cadre de l'hépatite C - Education thérapeutique - Education dans le cadre des endométrioses 	<ul style="list-style-type: none"> - Accompagnement en situation de crise du patient : <ul style="list-style-type: none"> - désorientation, - agitation extrême, - décès - Prise en charge et accompagnement du patient en fin de vie - Prise en charge et accompagnement du patient hospitalisé d'office, detenu. -