

FONCTION DE SOINS	COEFFICIENT 1	COEFFICIENT 4	COEFFICIENT 10	COEFFICIENT 20
<b>SOINS DE BASE</b>  Groupe de soins :  - Alimentation	<b>AUTONOMIE</b>  - Repas : recueil du choix du menu, installation et distribution	<b>DEPENDANCE MODEREE</b> <u>Dans au moins 2 groupes de soins</u>  Aide ponctuelle	<b>DEPENDANCE MAJEURE</b> <u>Dans au moins 2 groupes de soins</u>  Aide permanente ou réalisation de la quasi totalité des soins  - Boissons > 6 / 24 h	<b>DEPENDANCE TOTALE</b> <u>Dans au moins 2 groupes de soins</u>  Suppléance totale
- Locomotion mobilisation		- Installation  - Aide pour le lever, la marche, la mise au fauteuil, la douche, la toilette, le déshabillage, l'habillage (1 aide)	- Aide pour le lever, la marche, la mise au fauteuil (2 aides)	- Alitement permanent  - Changements de position fréquents
- Elimination		- Installation sur le bassin (ou mise à disposition de l'urinal)		
- Hygiène et confort	- Réfection du lit	- Change < 4 fois par 24h pour incontinence  - Petits soins d'hygiène <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soins de bouche</li> <li>- Soins d'yeux</li> </ul> - Bas anti thrombose : pose et Surveillance  - Douche bétadinée	- Prévention d'escarres  - Pose d'un <b>sur</b> -matelas anti-escarres  - Toilette au lit  - Change 4 à 6 fois par 24h pour incontinence	- Change > 6 fois par 24 h  - Prévention d'escarre  - Pose d'un matelas anti-escarres  - Toilette complète au lit et réfection de lit  - Toilette mortuaire

<u>SOINS</u>	<u>SOINS LEGERS</u>	<u>SOINS COURTS</u>	<u>SOINS LOURDS</u>	<u>SOINS TRES LOURDS</u>
<p><b>TECHNIQUES</b></p> <p>(Prédominance de soins)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prélèvements ou injections ≤ 4 / 24 h dont <b>hémocultures / ECBU</b></li> <li>- Surveillance des constantes ≤ 4 / 24 h (pouls, TA, température, saturation en O<sub>2</sub>, fréquence respiratoire)</li> <li>- Surveillance poids et taille</li> <li>- Surveillance de la douleur (EVA)</li> <li>- Glycémie capillaire</li> <li>- Diurèse</li> <li>- Bandelette urinaire</li> <li>- Quantifier les entrées et comptabiliser les sorties (Bilan entrée sortie)</li> <li>- Médicaments per os : distribution et aide a la prise</li> <li>- E.C.G</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prélèvements ou injections : 4 a 6 / 24 h</li> <li>- Surveillance des constantes 4 a 8 / 24 h</li> <li>- <b>Perfusion simple (pose, surveillance, retrait)</b></li> <li>- Surveillance de drains</li> <li>- Pose de sonde vésicale</li> <li>- Surveillance de sonde</li> <li>- Soins pré-opératoires</li> <li>- Surveillance postopératoire (intervention simple).</li> <li>- Surveillance d'apparition des nausées</li> <li>- Cathétérisme veineux</li> <li>- Aérosol</li> <li>- Soins pré - opératoires</li> <li>- Aide pour ponction - biopsie</li> <li>- <b>Pansement simple (local) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cicatrice</li> <li>- Application en 20 min maximum</li> <li>- Bain pour examen</li> <li>- Greffe</li> <li>- perfusion</li> </ul> </li> <li>- Lavement évacuateur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aide à ponction complexe</li> <li>- <b>Port à Cath (PAC) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Préparation</li> <li>- Surveillance</li> <li>- Pose et retrait aiguille</li> </ul> </li> <li>- Bains thérapeutiques</li> <li>- Surveillance des nausées et Vomissements</li> <li>-PSE : préparation, pose et surveillance</li> <li>-Isolement</li> <li>- <b>Pansement complexe (régionale) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Application sur un demi-corps</li> <li>- Exéma</li> <li>- Vac-thérapie (moyen)</li> <li>- Port à Cath (PAC)</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Soins légers et courts répétés</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surveillance constantes &gt; 8 / 24 h</li> <li>- Injections répétées &gt; 6 / 24 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perfusion lourde + diurèse + surveillance constantes / heure</li> <li>- <b>Transfusion</b></li> <li>- Evaluation de l'état de conscience 6 fois par 24h</li> <li>- Evaluation de l'état neurologique 3 fois par 24h</li> <li>- Aspirations itératives</li> <li>- Assistance continue</li> <li>- <b>Pansements lourds (générales)</b> et / ou répétés &gt; 3 / 24 h <ul style="list-style-type: none"> <li>- Application sur le corps entier</li> <li>- Vac-thérapie (grand)</li> <li>- « bulles »</li> </ul> </li> </ul>

<b><u>SOINS</u></b>	<b><u>AUTONOMIE</u></b>	<b><u>DEPENDANCE MODEREE</u></b>	<b><u>DEPENDANCE MAJEURE</u></b>	<b><u>DEPENDANCE TOTALE</u></b>
<p><b><u>RELATIONNELS</u></b>  <b><u>ET EDUCATIFS</u></b>                      (Personne soignée et /                      ou la famille)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Information succincte et ponctuelle</li> <li>- Instruction sur un problème de santé, un régime</li> <li>- Observation des comportements</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reformulation et explications</li> <li>- Informations d'aide contre :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'anxiété</li> <li>- la solitude</li> <li>- la vie hospitalière</li> </ul> </li> <li>- Relation d'aide a la vie quotidienne</li> <li>- <b>Bas de contention</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aide dans les situations et relations difficiles : dépression, angoisse majeure</li> <li>- Stimulations fréquentes pour reprise de conscience</li> <li>- Apprentissage de nouveaux comportements, d'auto - soins a la personne soignée ou a la famille.</li> <li>- <b>Education thérapeutique</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accompagnement en situation de crise du patient :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- désorientation,</li> <li>- agitation extrême,</li> <li>- décès</li> <li>- <b>violence verbale</b></li> </ul> </li> <li>- <b>Décès</b></li> </ul>