

FONCTION DE SOINS	COEFFICIENT 1	COEFFICIENT 4	COEFFICIENT 10	COEFFICIENT 20
<p><u>SOINS DE BASE</u></p> <p><u>Groupe de soins :</u></p> <p>- Alimentation</p>	<p><u>AUTONOMIE</u></p> <p>- Repas : recueil du choix du menu, installation et distribution</p>	<p><u>DEPENDANCE MODEREE</u></p> <p>Dans au moins 2 groupes de soins</p> <p>Aide ponctuelle</p>	<p><u>DEPENDANCE MAJEURE</u></p> <p>Dans au moins 2 groupes de soins</p> <p>Aide permanente ou réalisation de la quasi totalité des soins</p>	<p><u>DEPENDANCE TOTALE</u></p> <p>Dans au moins 2 groupes de soins</p> <p>Suppléance totale</p>
<p>- Locomotion mobilisation</p>		<p>- Installation</p> <p>- Aide pour le lever, la marche, la mise au fauteuil, la douche, la toilette, le déshabillage, l'habillage (1aide)</p>	<p>- Aide pour le lever, la marche, la mise au fauteuil (2 aides)</p>	
<p>- Elimination</p>				
<p>- Hygiène et confort</p>	<p>- Réfection du lit</p>	<p>- Petits soins d'hygiène</p> <p>- Soins de bouche</p> <p>- Soins d'yeux</p>		<p>- Alitement permanent</p> <p>- Changements de position fréquents</p>

<u>SOINS TECHNIQUES</u>	<u>SOINS LEGERS</u>	<u>SOINS COURTS</u>	<u>SOINS LOURDS</u>	<u>SOINS TRES LOURDS</u>
<p>(Prédominance de soins)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prélèvements (sang et/ou urine) ou injections ≤ 4 / 24 h dont ECBU/hémocultures - Surveillance des constantes ≤ 4 / 24 h (pouls, TA, température, saturation en O2, fréquence respiratoire) - Glycémie capillaire - Bandelette urinaire - Surveillance poids et taille - Surveillance glycémie capillaire - Surveillance de la douleur (EVA) - Médicaments per os : distribution et aide à la prise - Soins de bouche avec médicaments - Instillation oculaire - E.C.G 	<ul style="list-style-type: none"> - Prélèvements ou injections : 4 à 6 / 24 h - Surveillance des constantes 4 à 8 / 24 h - Perfusion simple (pose, surveillance, retrait) - Aérosol - Cathétérisme veineux (post Ponction Biopsie Hépatique (PBH) et/ou jugulaire) - Aide pour ponction - biopsie et surveillance - Lavement évacuateur - Pansement simple : <ul style="list-style-type: none"> - Point de ponction. - Ponction Biopsie Hépatique (PBH) transpariétale / transjugulaire - Perfusion 	<ul style="list-style-type: none"> - Médicaments per os : distribution et aide à la prise > 6 / 24 h - Transfusion de plaquettes, albumine ou facteurs immunoglobuline - Pose de sonde naso gastrique - Transfusion de plaquettes, albumine - Surveillance post ponction – biopsie - Surveillance post pbh trans jug - Pansement complexe <ul style="list-style-type: none"> - Post Ponction Biopsie hépatique - Port à Cath (PAC) <p><u>Soins légers et courts répétés</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Surveillance constantes > 8 / 24 h - Injections répétées > 6 / 24 h 	<ul style="list-style-type: none"> - Perfusion lourde + diurèse + surveillance constantes I heure - Port à Cath (PAC)/ PICC line : <ul style="list-style-type: none"> - Prélèvements et/ou injection - Pansements lourds et / ou répétés > 3 / 24 h - Transfusion sang - Aspirations itératives - Assistance continue

<u>SOINS</u>	<u>AUTONOMIE</u>	<u>DEPENDANCE MODEREE</u>	<u>DEPENDANCE MAJEURE</u>	<u>DEPENDANCE TOTALE</u>
<u>RELATIONNELS ET EDUCATIFS</u> (Personne soignée et /ou la famille)	<ul style="list-style-type: none"> - Information succincte et ponctuelle (accueil du patient, avant et au retour d'examens) - Instruction sur un problème de santé, un régime - Observation des comportements 	<ul style="list-style-type: none"> - Reformulation et explications - Informations d'aide contre : <ul style="list-style-type: none"> - l'anxiété - la solitude - la vie hospitalière - Relation d'aide a la vie quotidienne 	<ul style="list-style-type: none"> - Aide dans les situations et relations difficiles : dépression, angoisse majeure - Stimulations fréquentes pour reprise de conscience - Apprentissage de nouveaux comportements, d'auto - soins a la personne soignée ou a la famille : - Education thérapeutique 	<ul style="list-style-type: none"> - Accompagnement en situation de crise du patient : <ul style="list-style-type: none"> - désorientation, - agitation extrême, - décès