

FONCTION DE SOINS	COEFFICIENT 1	COEFFICIENT 4	COEFFICIENT 10	COEFFICIENT 20
<p><u>SOINS DE BASE</u></p> <p>Groupe de soins :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentation 	<p><u>AUTONOMIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Repas : recueil du choix du menu, installation et distribution 	<p><u>DEPENDANCE MODEREE</u></p> <p>Dans au moins 2 groupes de soins</p> <p>Aide ponctuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boissons ≤ 6 / 24 h - Restriction hydrique 	<p><u>DEPENDANCE MAJEURE</u></p> <p>Dans au moins 2 groupes de soins</p> <p>Aide permanente ou réalisation de la quasi totalité des soins</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boissons > 6 / 24 h 	<p><u>DEPENDANCE TOTALE</u></p> <p>Dans au moins 2 groupes de soins</p> <p>Suppléance totale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reprise alimentation post AVC
<ul style="list-style-type: none"> - Locomotion mobilisation 		<ul style="list-style-type: none"> - Installation - Aide pour le lever, la marche, la mise au fauteuil, la douche, la toilette, le déshabillage, l'habillage (1aide) 	<ul style="list-style-type: none"> - Aide pour le lever, la marche, la mise au fauteuil (2 aides) 	<ul style="list-style-type: none"> - Alitement permanent - Changements de position fréquents
<ul style="list-style-type: none"> - Elimination 		<ul style="list-style-type: none"> - Installation sur le bassin (ou mise à disposition de l'urinal) - Change de stomie - Penilex : pose et surveillance. Vidange de poche 		
<ul style="list-style-type: none"> - Hygiène et confort 	<ul style="list-style-type: none"> - Réfection du lit 	<ul style="list-style-type: none"> - Change < 4 fois par 24h pour incontinence - Petits soins d'hygiène <ul style="list-style-type: none"> - Soins de bouche - Soins d'yeux - Bas anti thrombose : pose et Surveillance 	<ul style="list-style-type: none"> - Toilette au lit - Change 4 à 6 fois par 24h pour incontinence - Prévention d'escarres 	<ul style="list-style-type: none"> - Change > 6 fois par 24 h pour incontinence - Prévention d'escarre > 6 fois par 24 h - Toilette complète au lit - Toilette mortuaire

SOINS TECHNIQUES (Prédominance de soins)	SOINS LEGERS	SOINS COURTS	SOINS LOURDS	SOINS TRES LOURDS
	<ul style="list-style-type: none"> - Prélèvements (sang et/ou urine) ou injections ≤ 4 / 24 h dont ECBU/hémocultures - Surveillance des constantes ≤ 4 / 24 h (pouls, TA, température, saturation en O2, fréquence respiratoire) - Surveillance poids et taille - Surveillance de la douleur (EVA) - Surveillance glycémie capillaire - Diurèse - Bandelette urinaire - Quantifier les entrées et comptabiliser les sorties (Bilan entrée sortie) - Médicaments per os : distribution et aide a la prise - Soins de bouche avec médicaments - Instillation oculaire - E.C.G 	<ul style="list-style-type: none"> - Prélèvements ou injections : 4 a 6 / 24 h - Surveillance des constantes 4 a 8 / 24 h - Perfusion simple (pose, surveillance, retrait) - Cathétérisme veineux (post Ponction Biopsie Hépatique (PBH) et/ou jugulaire) - Surveillance vomissements - Pose et surveillance de sonde naso gastrique - Pose et surveillance de sonde vésicale - Aérosol - Aide pour ponction - biopsie - Ablation mèche vaginale - Fixation sonde urinaire (« bouchon de champagne ») - Pansement simple : <ul style="list-style-type: none"> - Escarre locale - Cicatrice - Alcoolisé - Perfusion 	<ul style="list-style-type: none"> - Transfert d'un patient vers la salle de réveil ou la réanimation - Médicaments per os : distribution et aide a la prise toutes les 2 h - Port à Cath (PAC) : <ul style="list-style-type: none"> - Préparation - Pose et retrait aiguille - Surveillance - Pansement complexe <ul style="list-style-type: none"> - Escarre locorégional - Cathéter central - Port à Cath (PAC) - Alimentation entérale - Transfusion de plaquettes, albumine ou facteurs immunoglobuline - Surveillance post ponction – biopsie - Surveillance chimiothérapie - Lavage vésicale continu <p><u>Soins légers et courts répétés</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Surveillance constantes > 8 / 24 h - Injections répétées > 6 / 24 h 	<ul style="list-style-type: none"> - Médicaments per os : distribution et aide a la prise toutes les heures - Perfusion lourde + diurèse + surveillance constantes I heure - Port à Cath (PAC) : <ul style="list-style-type: none"> - Prélèvements et/ou injection - Retrait cathéter central - Surveillance « turp syndrome » - Pansements lourds et / ou répétés > 3 / 24 h <ul style="list-style-type: none"> - Escarre généralisée - Rupture de suture - Pansement qui fuit - Transfusion sanguine - Aspirations itératives - Assistance continue - Décaillotage

<p><u>SOINS RELATIONNELS ET EDUCATIFS</u> (Personne soignée et /ou la famille)</p>	<p><u>AUTONOMIE</u></p>	<p><u>DEPENDANCE MODEREE</u></p>	<p><u>DEPENDANCE MAJEURE</u></p>	<p><u>DEPENDANCE TOTALE</u></p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Information succincte et ponctuelle (accueil du patient, avant et au retour d'examens) - Instruction sur un problème de santé, un régime - Observation des comportements 	<ul style="list-style-type: none"> - Reformulation et explications - Informations d'aide contre : <ul style="list-style-type: none"> - l'anxiété - la solitude - la vie hospitalière - Relation d'aide a la vie quotidienne 	<ul style="list-style-type: none"> - Aide dans les situations et relations difficiles : dépression, angoisse majeure - Stimulations fréquentes pour reprise de conscience - Apprentissage de nouveaux comportements, d'auto - soins a la personne soignée ou a la famille : - Education thérapeutique 	<ul style="list-style-type: none"> - Accompagnement en situation de crise du patient : <ul style="list-style-type: none"> - désorientation, - agitation extrême, - décès - Prise en charge et accompagnement du patient en fin de vie